

寶齡 抑平菌 殺菌液 40 公絲/公撮(克羅希西定)

PBF Antigerm solution 40mg/ml(Chlorhexidine)

衛署藥製字第 039454 號 GMP G-5070

「作用」:

本品為一消毒殺菌劑，可迅速而有效的對抗細菌，其作用範圍廣泛，包括 G(+)及 G(-)，如綠膿桿菌等。

依研究報告顯示，手術前使用 Chlorhexidine

Gluconate，六分鐘後即可減少 99.9%之細菌。

Chlorhexidine Gluconate 用於外科手術手套之消毒，可維持六小時以上，本品可預防皮膚感染，進而減少交叉感染之危檢。

「成分」: Each ml contains

Chlorhexidine Gluconate 40.0mg

「適應症」:

一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

「用法用量」:

皮膚創傷及一般皮膚之清潔:

以清水濕潤患部後，取適量本品清洗，再以清水充分沖洗。若傷口深及皮膚深部者不適用本品。除非於特殊情況下，本品不建議長期重複使用於清潔廣大面積之肌膚。

手術前之皮膚清潔:

取適量以消毒海綿塗擦於所須之部位，停留 2 分鐘後，以消毒手巾擦乾，重複上述步驟一次。

手術前之全身淋浴:

以清水濕潤頭髮及身體後，取 25ml 本品清洗，再以清水沖除之，重複上述步驟一次。

開刀之刷手清潔:

濕潤手部及前臂，以 5ml 本品刷洗三分鐘後，特別注意指甲、指間之清潔，以水沖洗後，重複上述步驟一次，以消毒手巾擦乾。

個人居家清潔:

以溫水濕潤手部後，取 5ml 本品清潔 15 秒後，再以清水充分沖洗後擦乾。

「注意事項」:

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。
6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
8. 深部皮膚組織感染請就醫治療。
9. 如發生副作用(刺激感、皮膚炎、過敏性反應)，應立即停止使用。

「警語」:

1. 對藥物各成份過敏者不能使用。
2. 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。

「包裝」:

4000ML

醫師藥師藥劑生指示藥品

"請置放於 25°C 以下乾燥場所"